


豆類 (大豆・小豆)

ポイントは、「着蕾期」

大豆・小豆は、着蕾期にしっかり成長の切り替えを行なわせることが重要です。この時期に適度のストレスを与える目的で「アグリボ EX」の散布を行ないます。



枯れ上がりが遅い?

「アグリボ」剤の散布により、ごく稀に枯れ上がりが遅くなる場合があります。これは根張りが良くなっているために起こるものと考えられますが、収量には影響がありませんのでご安心ください。

ヤワラ、アグリボ3の活用!

「アグリボ EX」を散布する際には、展着促進材入りカルシウム剤「ヤワラ」の加用が効果的です。また、日照不足時は光触媒入りの「アグリボ3」の散布をお勧めします。

天候不順が予想される場合、「アグリボ EX」の代わりに「光触媒」入り「アグリボ3」の3,000倍希釈液の散布が有効です。

「アグリボ EX」や「アグリボ3」を葉面散布する際、「展着促進材」(界面活性剤・トレハロース)入り「ヤワラ」を1,000倍希釈相当で加用すると、散布液の展着性向上に効果的です。

ご質問 フリーダイヤル イーハナ イーヤサイ アグリボ
ご相談 **0120-187-183** 相談室

AGREVO

<http://www.agrevo.co.jp/>

株式会社アグリボ 〒240-0035 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町528
TEL:045-352-5327 FAX:045-352-5328